

## SGK 2007 SÖZLEŞMESİNE GÖRE OSTEOPOROZ REÇETE VERİLMESİ...

Trbazon SGK Kurumu Yetkilileri İle Görüşülmesi sonucunda

Osteoporoz reçetelerinin Raporlarındaki..

\*\*\*\*\* Senil Osteoporoz , postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteoporoz larda

1-0 steoporitik patolojik kırık bulunan ve lumber bölgeden posteroareteria veya lateral yapılan kemik mineral yoğunluğu(KMY) Ölçümünde L1 veya L2 veya L3 veya L4 değerlerinden HERHANGİ BİRİNİN (ayrı ayrı veya kendi aralarındaki T değerleri)VEYA FEMURAL bölgeden yapılan KMY ölçümünde T Değerlerinden HERHANGİ BİRİNİN -1 veya Daha Düşük olduğu durumlarda..

2- Lumber bölgeden posteroanter veya lateral yapılan KMY ölçümünde L1 veya L2 veya L3 veya L4 Değerlerinden herhangi birisi(ayrı ayrı veya kendi aralarındaki T değerleri) veya FEMURAL bölgeden yapılan FEMUR TOTAL veya FEMUR BOYNU KMY ölçümünde T değerlerinden herhangi birinin -2,5 veya daha DÜŞÜK olduğu hastalarda İLAÇ KULLANIM RAPORUNA dayanılarak Reçete edilebilir..

3-Kırık Riski İbaresini Taşıyan Raporlar Geçerli Değildir..

4- Bu uygulamalar SGK kapsamındaki SSK-BAĞ-KUR-EMEKLİ SANDIĞI Reçetelerinin hepsini Kapsamaktadır..

Meslektaşlarımıza Önemle Duyrulur.....

GS

GA